PATVIRTINTA
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2026 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-143

PASVALIO R. SALOČIŲ ANTANO POŠKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR EPINEFRINO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos (toliau – Įstaiga) pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirmos pagalbos organizavimą ir teikimą, pirmosios pagalbos rinkinių sudarymą ir priežiūrą, vaistinio preparato epinefrino įsigijimą, laikymą ir apskaitą bei atsakingų asmenų veiksmus Įstaigoje.

2. Aprašo tikslas - užtikrinti operatyvų ir tinkamą reagavimą staiga sutrikus mokinio (vaiko), darbuotojo ar kito Įstaigoje esančio asmens sveikatai.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450, Visuomenes sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 ir kitais pirmosios pagalbos organizavimą bei sveikatos saugą reglamentuojančiais teises aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teises aktuose.

II SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

5. Pirmąją pagalbą Įstaigoje teikia įvykio vietoje esantis pirmąją pagalbą teikti apmokytas darbuotojas. Visuomenes sveikatos specialistas pirmąją pagalbą teikia pagal savo kompetenciją, kai tuo metu yra Įstaigoje.

6. Darbuotojai, kuriems pagal teises aktus privalomas pirmosios pagalbos mokymas, turi būti išklausę nustatytą mokymo programą ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

7. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti pirmosios pagalbos rinkinių laikymo vietas, kuriame rinkinyje laikomas epinefrinas, ir Bendrojo pagalbos centro telefono numerį 112.

8. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar ūmiai sutrikus sveikatai, įvertinama įvykio vietos sauga, nukentėjusiojo būklė, suteikiama pirmoji pagalba ir, esant būtinybei, nedelsiant skambinama numeriu 112.

9. Jei nukentėjęs yra mokinys (vaikas), apie reikšmingą traumą, ūmų sveikatos sutrikimą ar greitosios medicinos pagalbos iškvietimą informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir Įstaigos administracija.

10. Nukentėjusysis, kuriam reikalinga skubi pagalba, nepaliekamas vienas iki jo būklė stabilizuojasi arba jį perima greitosios medicinos pagalbos specialistai.

III SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIAI

11. Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti patalpose, kuriose vykdomos bendrojo ugdymo programos. Rinkinys turi būti paženklintas baltu kryžiumi žaliame fone ir laikomas gerai matomoje, lengvai

pasiekiamoje vietoje, išskyrus rinkinio su epinefrinu laikymo atvejį.

12. Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtinto Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo aktualius reikalavimus.

13. Bendrojo ugdymo programas vykdančiame švietimo teikėjo pirmosios pagalbos rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 1 epinefrino 300 mikrogramų užpildytas švirkštiklis, skirtas 30 kg ar daugiau sveriantiems vaikams ir suaugusiesiems, ir ne mažiau kaip 1 epinefrino 150 mikrogramų užpildytas švirkštiklis, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg.

14. Jeigu tuo pačiu adresu esančiose ir tai pačiai Įstaigai priklausančiose patalpose yra daugiau nei vienas pirmosios pagalbos rinkinys ir bent viename jų yra epinefrino, kituose rinkiniuose jo gali nebūti. Rinkiniai turi būti aiškiai pažymėti, nurodant, kuriame rinkinyje epinefrinas yra.

15. Įstaigos vadovas paskiria atsakingą asmenį, kuris atsako už pirmosios pagalbos rinkinių atnaujinimą ir papildymą, epinefrino kokybę, tinkamumo vartoti laiką, tinkamas laikymo sąlygas, apskaitą bei netinkamo naudoti epinefrino išėmimą ir perdavimo šalinti organizavimą.

IV SKYRIUS
EPINEFRINO ĮSIGIJIMAS, LAIKYMAS IR APSKAITA

16. Epinefriną Įstaiga gali įsigyti tik iš visuomenės vaistinės. Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo vaistinei pateikia Įstaigos vadovo patvirtintą laisvos formos paraišką, kurioje nurodomi teisės aktuose nustatyti duomenys. Epinefrinas išduodamas asmeniui, pateikusiam Įstaigos vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

17. Epinefrinas laikomas išorinėje pakuotėje, apsaugotas nuo šviesos, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Jo negalima šaldyti ar užšaldyti.

18. Pirmosios pagalbos rinkinio, kuriame yra epinefrino, laikymo vieta turi būti vaikams nepasiekiama, tačiau esant būtinybei greitai prieinama pirmąją pagalbą teikti apmokytiems asmenims.

19. Epinefrino tirpalas periodiškai tikrinamas, kaip nurodyta jo pakuotes lapelyje, taip pat sekamas tinkamumo vartoti laikas. Pakitus tirpalo spalvai, jam susidrumstus, atsiradus kietų dalelių ar pasibaigus tinkamumo vartoti laikui, švirkštiklio vartoti negalima.

20. Epinefrino apskaita vykdoma popieriniame arba elektroniniame apskaitos žurnale.

Jame registruojamas epinefrino įsigijimas, panaudojimas ir išėmimas kaip farmacinės atliekos. Skirtingo stiprumo epinefrino apskaita pildoma atskirai.

21. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir (ar) netinkamos kokybės epinefrinas išimamas iš pirmosios pagalbos rinkinio ir tvarkomas kaip farmacinė atlieka teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
ANAFILAKSIJOS ATPAŽINIMAS

22. Anafilaksija įtariama, kai staiga, dažniausiai po galimo kontakto su alergenu, atsiranda ir sparčiai progresuoja vienas ar keli žemiau nurodyti požymiai.

23. Galimi anafilaksijos požymiai:

Kvėpavimo sistemos:

pasunkėjęs ar triukšmingas kvėpavimas;

dusulys, švokštimas;

gerklės veržimas, užkimimas ar staiga pasikeitęs balsas;

liežuvio ar gerklės tinimas.

Kraujotakos ir bendros būklės:

staigus silpnumas ar galvos svaigimas;

išblyškimas;

sąmonės sutrikimas ar netekimas;

kolapso požymiai.

Odos ir gleivinės:

staiga atsiradusi dilgėlinė ar intensyvus niežėjimas;

odos paraudimas;

lūpų, liežuvio, akių vokų ar veido tinimas.

Virškinimo sistemos:

stiprus pilvo skausmas;

pasikartojantis vėmimas;

kiti staiga atsiradę ryškūs virškinimo sistemos simptomai kartu su kitais alerginės reakcijos požymiais.

24. Anafilaksija gali pasireikšti ir be odos bėrimo, todėl vien bėrimo nebuvimas nėra pagrindas atmesti anafilaksiją.

25. Įtarus anafilaksiją, pagalba pradedama teikti nedelsiant. Negalima laukti, kol atvyks mokinio tėvai, Įstaigos administracijos atstovas ar visuomenės sveikatos specialistas.

VI SKYRIUS
VEIKSMAI, ĮTARIANT ANAFILAKSIJĄ

26. Įtarus anafilaksiją, nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba telefonu 112 ir pradedami pirmosios pagalbos veiksmai.

27. Epinefrinas panaudojamas pagal konkretaus užpildyto švirkštiklio pakuotės lapelyje pateiktą naudojimo instrukciją ir pirmosios pagalbos mokymų metu įgytas žinias. Iki 30 kg sveriančiam vaikui naudojamas 150 mikrogramų, 30 kg ar daugiau sveriančiam vaikui ir suaugusiajam - 300 mikrogramų epinefrino švirkštiklis.

28. Esant galimybei, pagalbą organizuoja keli darbuotojai vienu metu:

Pirmasis darbuotojas:

lieka su nukentėjusiuoju;

vertina jo būklę;

panaudoja epinefrino švirkštiklį;

teikia kitą būtiną pirmąją pagalbą.

Antrasis darbuotojas:

skambina telefonu 112;

tiksliai nurodo Mokyklos adresą ir vietą, kur yra nukentėjusysis;

vykdo 112 operatoriaus nurodymus.

Trečiasis darbuotojas arba administracijos atstovas:

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);

pasitinka greitosios medicinos pagalbos brigadą prie įėjimo ir palydi ją iki nukentėjusiojo;

prireikus užtikrina kitu mokinių priežiūrą.

29. Jei įvykio vietoje yra tik vienas darbuotojas, jo prioritetas yra nukentėjusiojo gyvybės išsaugojimas:

epinefrino panaudojimas, skambutis 112 ir pirmosios pagalbos teikimas. Administracijos ir tėvų informavimas atliekamas, kai tik tai galima padaryti neatidedant būtinosios pagalbos.

30. Nukentėjusiojo būklė stebima, jis nepaliekamas vienas ir vykdomi Bendrojo pagalbos centro operatoriaus ar greitosios medicinos pagalbos specialisto nurodymai. Jei asmuo netenka sąmonės ir nekvėpuoja normaliai, pradedamas pradinis gaivinimas.

31. Greitoji medicinos pagalba kviečiama ir tais atvejais, kai po epinefrino panaudojimo asmens būklė pagerėja.

32. Apie įtariamą anafilaksiją ir epinefrino panaudojimą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami nedelsiant po to, kai iškviesta greitoji medicinos pagalba ir pradėta teikti būtinoji pirmoji pagalba. Tėvų informavimas negali uždelsti epinefrino panaudojimo ar skambučio 112. Tėvams pranešama: kas atsitiko; kokie simptomai pastebėti; ar ir kada panaudotas epinefrino švirkštiklis; kad iškviesta greitoji medicinos pagalba; į kurią gydymo įstaigą nukentėjusysis išvežamas, jeigu ši informacija žinoma.

33. Apie epinefrino panaudojimą informuojamas už pirmosios pagalbos rinkinius atsakingas asmuo, kuris užregistruoja panaudojimą ir organizuoja rinkinio papildymą. Registruojant nurodoma: įvykio data ir laikas; įvykio vieta; nukentėjęs asmuo; aplinkybės ir, jei žinoma, galimas alergenas; pastebėti simptomai; epinefrino panaudojimo laikas ir dozė; švirkštiklį panaudojęs asmuo; skambučio 112 laikas; greitosios medicinos pagalbos atvykimo laikas, jei žinomas; tėvų informavimo laikas ir informavęs asmuo; kiti atlikti pirmosios pagalbos veiksmai; nukentėjusiojo perdavimo greitosios medicinos pagalbos specialistams aplinkybės.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami Įstaigos nustatyta tvarka. Jiems turi būti žinomos pirmosios pagalbos rinkinių ir epinefrino laikymo vietos.

35. Visuomenes sveikatos specialistas pagal kompetenciją konsultuoja Įstaigos bendruomenę pirmosios pagalbos organizavimo ir sveikatos saugos klausimais.

36. Duomenys apie nukentėjusį asmenį ir jo sveikatos būklę tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

37. Už šio Aprašo įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Įstaigos vadovas, jo paskirtas atsakingas asmuo ir pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai.

38. Pasikeitus teises aktų reikalavimams, taikomos aktualios teisės aktų nuostatos, o Aprašas prireikus atnaujinamas.

_____

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos
pirmosios pagalbos organizavimo ir
epinefrino naudojimo tvarkos aprašo
1 priedas

PASVALIO R. SALOČIŲ ANTANO POŠKOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

PARAIŠKA IR ĮGALIOJIMAS
DĖL VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO ĮSIGIJIMO

14__m. _____d. Nr. ____

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintu Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašu, prašau parduoti vaistinį preparatą epinefriną švietimo teikėjo pirmosios pagalbos rinkiniui (-iams) suformuoti / papildyti.

Prašomas įsigyti vaistinis preparatas:

1. Epinefrinas 150 mikrogramų injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje - _vnt.
2. Epinefrinas 300 mikrogramų injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje - __vnt.

Pirmosios pagalbos rinkinių, kuriuose turi būti epinefrino, kiekis - __.

Įgalioju: _____

(vardas, pavarde, asmens kodas, pareigos)

Įstaigos vardu pateikti šią paraišką ir atsiimti joje nurodytą vaistinį preparatą epinefriną. Paraiškoje prašomas kiekis negali viršyti po 1 vnt. kiekvieno privalomo stiprumo epinefrino vienam pirmosios pagalbos rinkiniui, kuriame jis turi būti laikomas.

Atsiimdamas vaistinį preparatą įgaliotas asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Direktorius _____ _____
(parašas) (vardas, pavarde)

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos
pirmosios pagalbos organizavimo ir
epinefrino naudojimo tvarkos aprašo
2 priedas

TRUMPAS VEIKSMŲ ALGORITMAS „ĮTARIAMA ANAFILAKSIJA“

1. ATPAŽINK

Staigus dusulys, švokštimas, gerklės ar liežuvio tinimas, ryškus silpnumas, sąmonės sutrikimas ar kelių organizmo sistemų alerginės reakcijos požymiai.

2. VEIK NEDELSIANT

Atnešk tinkamos dozės epinefrino švirkštiklį.

3. PANAUDOK EPINEFRINĄ

Pagal švirkštiklio gamintojo instrukciją suleisk į išorinę šlaunies dalį.

4. SKAMBINK 112

Pasakyk: „įtariama anafilaksija. Panaudotas epinefrino švirkštiklis.“

5. NEPALIK VIENO

Stebėk kvėpavimą ir sąmonę. Vykdyk 112 operatoriaus nurodymus.

6. INFORMUOK TĖVUS

Tik pradėjus teikti būtinąją pagalbą ir iškvietus 112.

7. DOKUMENTUOK ĮVYKĮ

Užrašyk simptomus, epinefrino panaudojimo ir 112 iškvietimo laiką bei atliktus veiksmus.

SVARBIAUSIA: EPINEFRINAS ⇨ 112 ⇨ TĖVAI

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos
pirmosios pagalbos organizavimo ir
epinefrino naudojimo tvarkos aprašo
3 priedas

PRANEŠIMAS APIE EPINEFRINO ŠVIRKŠTIKLIO PANAUDOJIMĄ

Įvykio data: _____

Įvykio laikas: _____

Įvykio vieta: _____

Nukentėjusiojo vardas, pavardė: _____

Klasė (jei mokinys): _____

Galimas alergenas / įvykio aplinkybės: _____

_____

Pastebėti simptomai: _____

_____

Epinefrino panaudojimo laikas: _____

Panaudoto švirkštiklio dozė: _____

Švirkštiklį panaudojęs asmuo (vardas, pavardė, pareigos):

_____

Skambučio 112 laikas: _____

GMP atvykimo laikas (jei žinomas): _____

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo laikas: _____

Tėvus informavęs asmuo: _____

Kiti suteiktos pirmosios pagalbos veiksmai: _____

_____

Nukentėjusiojo perdavimo GMP specialistams aplinkybės / laikas:

_____

_____

Pranešimą užpildė: _____

Data, parašas: _____

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos
pirmosios pagalbos organizavimo ir
epinefrino naudojimo tvarkos aprašo
4 priedas

VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO APSKAITOS ŽURNALAS

Epinefrino stiprumas: □150 mikrogramų □300 mikrogramų Atsakingas asmuo: _____

Eil. Nr.	**Data**	**Operacija**	**Serija**	**Tinkamumo vartoti laikas**	**Įsigyta, vnt.**	**Panaudota, vnt.**	**Panaudojimo priežastis / asmuo**	**Išimta, vnt.**	**Perdavimo šalinti data / kam perduota**	**Likutis/ pastabos**
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										